홍역 예방 안내문

배려와 존중으로
꿈을 설계하는
행복한 학교

학부모님 안녕하십니까?

질병관리청에서 해외 방문이나 환자 접촉을 통해 홍역에 감염되는 사례가 지속적으로 발생하여 홍역에 대한 대비와 주의를 요청해 온 바 안내하오니 감염병 확산 방지를 위하여 학부모님들께서는 자녀의 감염병 예방 관리에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

1. 홍역 예방 안내

<table>
<tr><td rowspan="6">홍역의
특징</td><td>홍역
의심
증상</td><td>고열과 함께 피부 발진이 나타나고, <u>기침, 콧물, 결막염</u>이 동반될 수 있습니다</td><td rowspan="6"> </td></tr>
<tr><td>전염성</td><td>홍역은 전염력이 매우 강하며 항체가 없는 사람이 노출되었을 때 90% 이상이 감염됩니다.</td></tr>
<tr><td>감염경로</td><td>환자와 직접 접촉하거나 호흡기 분비물 등을 통해 감염됩니다.</td></tr>
<tr><td>전염
기간</td><td>환자에서 피부 발진이 발생하기 4일 전부터 발생 후 4일까지 홍역바이러스가 전파될 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>잠복기</td><td>바이러스에 감염되어 증상이 나타나기까지의 기간은 7~21일(평균 10~12일)입니다.</td></tr>
<tr><td>예방접종</td><td>홍역은 MMR(홍역·유행성이하선염·풍진) <u>백신 2회 접종</u>으로 효과적으로 예방할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>예방접종
안내</td><td colspan="2"><u>자녀가 홍역(MMR) 예방접종을 받은 적이 없고 홍역을 앓은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 홍역 예방접종</u>을 받도록 합니다. 홍역 환자와 접촉한 후에도 3일 안에 예방접종을 하면 발병을 예방할 수 있으며, 발병하여도 증상 완화 효과가 있습니다.
최근 해외교류 증가에 따른 국내 홍역 감염병의 지속적인 발생</td></tr>
<tr><td>자녀가
홍역에
걸렸거나
의심될
경우</td><td colspan="2">1. 홍역(의심) 증상이 있는 경우 등원·등교를 중지하고, 마스크를 착용한 후 의료기관에서 진료(대중교통 이용금지)받도록 합니다.
* 발열, 발진과 함께 기침, 콧물, 결막염 등의 증상이 동반하는 경우
2. 의료기관 진료 결과, 홍역(의심) 진단받으면 학교에 감염사실을 알리고, 전염 기간(발진 발생 전 4일부터 발진 후 4일까지) 동안 등교를 중지하고 학원 등 사람이 많이 모이는 장소에 가지 않습니다.
3. 가족 중에 12개월 이하 영유아나 임신부, 면역기능이 저하된 사람이 있는 경우 즉시 의사와 상의합니다.</td></tr>
</table>

2. 홍역 주요 발생 국가

– 전 세계적으로 증가, 해외여행 증가로 감염 가능성이 더 높아지고 있습니다.

□ **지역별 주요 국가 2024년 1월 홍역 확진환자수***

중동		동남아시아		서태평양		아메리카 · 유럽	
국가명	환자수	국가명	환자수	국가명	환자수	국가명	환자수
이라크	5,551	인도	4,353	말레이시아	310	카자흐스탄	9,510
아프가니스탄	1,354	인도네시아	476	중국	30	키르기스스탄	1,988
아랍에미리트	74	네팔	91	호주	7	러시아	1,401
시리아	26	태국	51	대한민국	1	루마니아	338
모로코	23	동티모르	12	싱가포르	1	우즈베키스탄	136
바레인	5	부탄	11	베트남	1	아르메니아	50
카타르	4	방글라데시	7	-	-	조지아	36
요르단	3	미얀마	7	-	-	오스트리아	34
쿠웨이트	2	스리랑카	3	-	-	독일	26
레바논	2	-	-	-	-	알바니아	18

* '24년 보고된 각국의 실험실 확진, 역학적 연관 또는 임상기준에 합당한 홍역 환자 수

3. 해외여행 시 홍역 예방 수칙

4. 홍역 예방접종 안내



연령별 홍역 예방접종 기준

연령	접종 방법
생후 0~5개월	접종 대상 아님
생후 6~11개월 (가속접종*) *불가피하게 표준 접종 일정을 지키지 못할 때, 신속하게 면역을 획득해야 하는 경우 적용	해외여행 시 1회 접종 * 생후 12개월 이전의 MMR 접종은 접종 횟수에 포함되지 않아, 향후 표준 예방접종 일정에 맞춰 2회 접종 필요
생후 12~15개월 (적기접종)	1차 접종
4~6세 (적기접종)	2차 접종
청소년 및 성인*	**※ 면역의 증거가 없는 경우** 최소 4주 이상의 간격으로 2회(적어도 1회) 접종

* 1968년 1월 1일 이전에 출생한 경우, 홍역에 대한 자연면역이 있는 것으로 판단하여 접종 불필요

※ 홍역 면역의 증거가 없는 경우

과거 예방접종 기록이 없으면서 홍역에 걸린 적이 없거나
홍역 항체가 확인되지 않는 1968년 1월 1일 이후 출생자

2024. 4. 23.

인천숭의초등학교장